Aves Marinas de Asturias

Protégelas

35 Gaviota Patiamarilla
Larus michahellis
52-58 cm.

14 Alcatraz Atlántico
Morus bassanus
85-97 cm.

6 Fulmar Boreal
Fulmarus glacialis
43-52 cm.

33 Gavión Atlántico
Larus marinus
61-74 cm.

34 Gaviota Argéntea
Larus argentatus
54-60 cm.

31 Gaviota Cana
Larus canus
40-46 cm.

41 Gaviota Tridáctila
Rissa tridactyla
37-42 cm.

40 Gaviota de Sabine
Larus sabini
30-36 cm.

42 Charrán Patinegro
Sterna sandvicensis
37-43 cm.

38 Gaviota Cabecinegra
Larus melanocephalus
37-40 cm.

32 Gaviota de Delaware
Larus delawarensis
41-49 cm.

7 Pardela Cenicienta
Calonectris diomedea
45-56 cm.

8 Pardela Capirotada
Puffinus gravis
43-51 cm.

9 Pardela Sombría
Puffinus griseus
40-50 cm.

30 Págalo Rabero
Stercorarius longicaudus
35-41 cm.

36 Gaviota Sombría
Larus fuscus
48-56 cm.

39 Gaviota Enana
Larus minutus
24-28 cm.

27 Págalo Grande
Stercorarius skua
50-58 cm.

28 Págalo Pomarino
Stercorarius pomarinus
42-50 cm.

29 Págalo Parásito
Stercorarius parasiticus
37-44 cm.

10 Pardela Pichoneta
Puffinus puffinus
30-35 cm.

44 Charrán Común
Sterna hirundo
34-37 cm.

11 Pardela Balear
Puffinus mauretanicus
34-39 cm.

47 Fumarel Cariblanco
Chlidonias hybridus
24-28 cm.

48 Fumarel Común
Chlidonias niger
22-26 cm.

45 Charrán Ártico
Sterna paradisea
33-39 cm.

37 Gaviota Reidora
Larus ridibundus
35-39 cm.

24 Ostrero
Haematopus ostralegus
39-44 cm.

46 Charrancito
Sterna albifrons
21-25 cm.

43 Charrán Rosado
Sterna dougallii
33-36 cm.

12 Paíño Europeo
Hydrobates pelagicus
15-16 cm.

13 Paíño Boreal
Oceanodroma leucorhoa
18-21 cm.

16 Cormorán Moñudo
Phalacrocorax aristotelis
68-78 cm.

51 Frailecillo Atlántico
Fratercula arctica
28-34 cm.

19 Pato Havelda
Clangula hyemalis
39-47 cm.

50 Arao Común
Uria aalge
38-46 cm.

49 Alca Común
Alca torda
38-43 cm.

22 Serreta Mediana
Mergus serrator
52-58 cm.

26 Vuelvepiedras
Arenaria interpres
21-24 cm.

15 Cormorán Grande
Phalacrocorax carbo
77-94 cm.

Somormujo Lavanco 4
Podiceps cristatus
46-51 cm.

20 Negrón Común
Melanitta nigra
44-54 cm.

25 Correlimos Oscuro
Calidris maritima
19-22 cm.

23 Falaropo Picogrueso
Phalaropus fulicaria
20-22 cm.

21 Negrón Especulado
Melanitta fusca
51-58 cm.

18 Eider Común
Somateria mollissima
60-70 cm.

2 Colimbo Ártico
Gavia arctica
63-75 cm.

3 Colimbo Grande
Gavia immer
73-88 cm.

5 Zampullín Cuellinegro
Podiceps nigricollis.
28-34 cm.

1 Colimbo Chico
Gavia stellata
55-67 cm.

53 Martín Pescador
Alcedo atthis
16 cm.

17 Garceta Común
Egretta garzetta
55-65 cm.

49 Alca Común
Alca torda
38-43 cm.

50 Arao Común
Uria aalge
38-46 cm.

Las aves marinas no pertenecen a un sólo orden, pero todas han logrado adaptarse al medio marino y comparten características anatómicas comunes.

Los **Colímbos** son aves acuáticas especializadas en la captura de peces buceando. Cuando nadan, suelen ir bastante hundidos. El pico recto y el cuello grueso los distingue de los cormoranes. El **Colimbo Chico** (1) (*Gavia stellata*) es el de menor tamaño de los tres. Es escaso aunque invernante regular de la bahía de Gijón. El **Colimbo Ártico** (2) (*Gavia arctica*) nos visita en pequeño número durante el invierno. Más frecuente resulta el **Colimbo Grande** (3) (*Gavia immer*) que además de poseer el pico más fuerte de las tres especies, se distingue de los otros por tener un bulto en la frente.

Los **Somormujos** y **Zampullines** son aves de aguas someras. En invierno penetran en nuestros puertos y bahías. El **Somormujo Lavanco** (4) (*Podiceps cristatus*) es migrante e invernante regular. Anida en los pantanos asturianos. En el plumaje nupcial es una de las aves más llamativas de Europa; en invierno llama la atención su cuello largo y delgado. El **Zampullín Cuellinegro** (5) (*Podiceps nigricollis*) es un migrador común permaneciendo durante el invierno en puertos y rías. Su tamaño es muy pequeño.

Las **Pardelas** pertenecen al Orden Procellariformes. Son aves marinas pelágicas con gran capacidad para el vuelo y solo se acercan a tierra a nidificar. En Asturias son frecuentes la **Pardela Capirotada** (8) (*Puffinus gravis*) con capirote oscuro que contrasta con un collar claro y una marca oscura en el 'hombro', la **Pardela Pichoneta** (10) (*Puffinus puffinus*) de plumaje muy contrastado, la **Pardela Balear** (11) (*Puffinus mauretanicus*) parecida a la Pichoneta, con la cola más corta y algunas marcas oscuras en la zona de la 'axila', la **Pardela Sombría** (9) (*Puffinus griseus*) muy oscura y con reflejos plateados en la parte inferior de las alas, y la **Pardela Cenicienta** (7) (*Calonectris diomedea*) con una coloración dorsal gris. También pertenecen a este orden el **Fulmar Boreal** (6) (*Fulmar glacialis*) similar a una gaviota, aunque más compacto y con un vuelo diferente, planeando sobre el mar con las alas rígidas. En los acantilados marinos en donde anidan, echan a otras aves marinas escupiéndoles una secreción oleosa de origen gástrico. El **Paíño Europeo** (12) (*Hydrobates pelagicus*) y el **Paíño Boreal** (13) (*Oceanodroma leucorhoa*) son las más pequeñas de las aves marinas. Ponen sus huevos en grietas de las paredes rocosas de las islas. Los pollos de todas estas especies tardan mucho en desarrollarse: más de dos meses.

Los **Alcatraces** (Familia *Sulidae*) sólo tienen un representante en las costas cantábricas, el **Alcatraz Atlántico** (14) (*Morus bassanus*) que es muy numeroso en el paso migratorio otoñal. Se lanzan en picado contra el mar para capturar los peces. Con sus 190 cm. de envergadura es una de mayores aves marinas cantábricas.

Los **Cormoranes** (Familia *Phalacrocoracidae*) son aves grandes y oscuras que pescan buceando. Su plumaje está poco impermeabilizado, por lo que tienen que secarse al sol. El **Cormorán Grande** (15) (*Phalacrocorax carbo*) se posa con las alas en cruz para secarse después de zambullirse para pescar.

Se calcula que necesita consumir unos 750 g. de pescado diariamente, El **Cormorán Moñudo** (16) (*Phalacrocorax aristotelis*) es de menor tamaño. Su nombre se debe al penacho de plumas que luce en el plumaje nupcial. Anida por toda la costa asturiana (incluido el Cabo Torres), por lo que, al estar declarada como especie vulnerable, se intenta compaginar sus hábitos con el desarrollo portuario e industrial.

Entre las **Ciconiiformes**, La **Garceta Común** (17) (*Egretta garzetta*) no es propiamente un ave marina, aunque frecuentemente se la puede ver alimentándose en puertos y bahías de aguas tranquilas.

Las **Anatidas** (patos) son generalmente aves acuáticas de aguas dulces o salobres. Cinco especies de patos viven en las aguas marinas al menos durante el invierno. El **Eider Común** (18) (*Somateria mollissima*) es un invernante regular aunque en escaso número en nuestras costas. El abundante plumón con el que recubren sus nidos es recogido en las colonias de cría del norte de Europa para confeccionar los edredones de pluma natural. El **Pato Havelda** (19) (*Clangula hyemalis*) es escaso aunque regular en invierno. Muestra preferencia por bahías y desembocaduras de las rías. Mucho más numeroso resulta el **Negrón Común** (20) (*Melanitta nigra*) que es un migrador e invernante en buen número. Se alimenta de moluscos bivalvos que consigue bucleando hasta 14 m. de profundidad. Más escaso resulta el **Negrón Especulado** (21) (*Melanitta fuscal*, que se distingue del anterior en vuelo, por poseer una banda blanca en el ala. La **Serreta Mediana** (22) (*Mergus serrator*) tiene el pico muy fino y aserrado lo que denota una dieta especializada en peces. Es migradora e invernante regular pero escasa.

Las aves **Limícolas** (que se alimentan en el limo) son más propias de las rías y estuarios. Cuatro especies viven en las costas rocosas o arenosas. El **Falaropo Picogrueso** (23) (*Phalaropus fulicaria*) es migrante regular y numeroso, más escaso como invernante. Anida en la tundra ártica. El **Ostrero** (24) (*Haematopus ostralegus*) es fácilmente reconocible por su plumaje blanco y negro. El pico largo y estrecho lo introduce entre las valvas entreabiertas de los moluscos y les corta el músculo constrictor. El **Correlimos Oscuro** (25) (*Calidris maritima*) es invernante regular. La bahía de Gijón albergaba el mayor número de estas aves invernantes de la península ibérica. El **Vuelvepiedras** (26) (*Arenaria interpres*) puede verse durante todo el año en la costa, siendo más abundante en invierno. Con el pico levanta algas y piedrecillas para buscar pequeños invertebrados marinos.

Los **Págalos**, son aves de aspecto parecido a gaviotas, pero con colaciones oscuras y vuelo más rápido. Acosan a otras aves pescadoras hasta hacerles soltar sus presas. También son depredadores de aves, peces y lemmings. El **Págalo Grande** (27) (*Stercorarius skua*) tiene el cuerpo en forma de barril y en vuelo se distingue una franja blanca en el ala. El **Págalo Pomarino** (28) (*Stercorarius pomarinus*) es un migrador pelágico. En aguas costeras asturianas puede verse en el paso postnupcial de julio a diciembre. El **Págalo Parásito** (29) (*Stercorarius parasiticus*) cría en la tundra. Se alimenta de las presas que consigue acosando a las aves marinas que acaban de pescar y también de aves y pollos. El **Págalo Rabero** (30) (*Stercorarius longicaudus*) es migrador regular y el más raro de los cuatro en nuestras aguas. Se puede ver de agosto a noviembre.

Las **Gaviotas** son las aves marinas más conocidas y las menos especializadas. Son buenas voladoras y viven ligadas a aguas litorales. Su dieta es bastante variada, suelen ser pescadoras y carroñeras. La **Gaviota Cana** (31) (*Larus canus*) es una gaviota de tamaño medio, invernante regular pero en pequeño número. La **Gaviota de Delaware** (32) (*Larus delawarensis*) es una especie norteamericana. Desde el invierno de 1986-87 invierna regularmente en Gijón. El **Gavión Atlántico** (33) (*Larus marinus*) es la mayor de las gaviotas. Se le distingue bien en los bandos mixtos por ser más alto y con el pico más robusto que las demás especies. Su plumaje se asemeja mucho a la Gaviota Sombría distinguiéndose de esta por poseer las patas de color rosado. La **Gaviota Argéntea** (34) (*Larus argentatus*) es un migrador e invernante común y regular. Tiene el dorso gris claro y las patas rosadas. La bahía de Gijón es el lugar de Asturias donde es más numerosa en invierno. La **Gaviota Patiamarilla** (35) (*Larus michahellis*) es la más común en Asturias. Nidifica en gran número por toda la costa. Su alimentación actual consiste sobre todo en desperdicios de origen humano. Muy parecida es la **Gaviota Sombría** (36) (*Larus fuscus*) que se distingue por tener el plumaje del dorso más oscuro. Está presente todo el año siendo más numerosa en otoño e invierno. La **Gaviota Reidora** (37) (*Larus ridibundus*) es de tamaño pequeño y abunda en otoño e invierno en las rías. Se parece mucho a la **Gaviota Cabecinegra** (38) (*Larus melanocephalus*) pero las aves adultas de esta especie, tienen las puntas de las alas blancas. Es invernante regular de la bahía de Gijón, La **Gaviota Enana** (39) (*Larus minutus*) con sus 24-28 cm. es la menor de las gaviotas. Tiene un vuelo errático y se alimenta en la superficie del agua o cazando insectos al vuelo. La **Gaviota de Sabine** (40) (*Larus sabini*) cría en el alto Ártico del norte de Siberia y Norte América. Es migrador regular en Asturias, siendo más rara en invierno. La **Gaviota Tridáctila** (41) (*Rissa tridactyla*) es una especie pelágica y tiene la cola ligeramente escotada. Pasa el invierno en los puertos. Cuando está posada, llama la atención el corto tamaño de sus patas.

Los **Charranes y Fumareles** pertenecen a la Familia *Sterninae*. Son aves que recuerdan a las gaviotas, pero de aspecto más grácil, alas largas y puntiagudas y cola escotada. Son aves pescadoras de vuelo elegante. El **Charrán Patinegro** (42) (*Sterna sandvicensis*) es un migrador regular de aguas litorales, penetrando en bahías y puertos. Se alimentan de peces pequeños tipo boquerón y alevines de sardina, mugil y lubina. La presencia del **Charrán Rosado** (43) (*Sterna dougallii*) en nuestras aguas, es escasa. Suelen verse en la primera quincena de octubre. Más común y numeroso, es el **Charrán Común** (44) (*Sterna hirundo*), migrador regular y escaso como invernante. Se lanza en picados verticales para capturar boquerones, argentinas y pequeñeros; El **Charrán Ártico** (45) (*Sterna paradisea*) está presente en las aguas litorales en las mismas épocas que el Charrán Común, distinguiéndose de este por la banda estrecha de color negro en la parte interna del ala. El **Charrancito** (46) (*Sterna albifrons*) es el menor de los charranes: tan sólo mide 24 cm. Es migrador común que se alimenta de peces pequeños, moluscos y crustáceos. Después de capturar sus presas, las ingieren en el aire. El **Fumarel Cariblanco** (47) (*Chlidonias hybridus*) es un migrante regular en otoño, pero bastante más escaso que el **Fumarel Común** (48) (*Chlidonias niger*) migrador otoñal regular y común. Tienen un vuelo tambaleante y errático. Comen insectos que cazan sobre el agua.

Los **Álcidos** son una familia de aves exclusivamente marinas, pelágicas, de cuerpos macizos y plumajes muy densos e impermeables de color blanco y negro. Tienen picos fuertes y alas reducidas que utilizan como aletas al bucear. Llegan a nuestras aguas en otoño, siendo invernantes regulares y numerosos. Permanecen mucho tiempo flotando en las aguas litorales por lo que son las especies más sensibles a las mareas negras. El **Alca Común** (49) (*Alca torda*) tiene el pico plano y romo, recordando un pequeño pingüino. La bahía de Gijón es un importante lugar de invernada de esta especie, El pico del **Arao Común** (50) (*Uria aalge*) tiene forma de puñal, y en vuelo, las patas sobresalen por detrás de la cola y tiene una mancha oscura en la zona de la 'axila'. En el **Frailecillo Atlántico** (51) (*Fratercula arctica*) destaca la cabeza grande y el pico muy ancho. Se alimenta de peces, crustáceos y zooplancton. Anida en madrigueras en las laderas de las costas de las Islas Británicas.

Otras aves marinas citadas en la costa asturiana

52. Somormujo Cuellirrojo	*Podiceps grisegena*	40-46 cm.
53. Zampullín Cuellirrojo	*Podiceps auritus*	31-38 cm.
54. Albatros Ojeroso	*Diomedea melanophris*	80-95 cm.
55. Petrel de Bulwer	*Bulweria bulwerii*	25-29 cm.
56. Pardela Chica	*Puffinus assimilis*	25-30 cm.
57. Paíño de Wilson	*Oceanites oceanicus*	16-18 cm.
58. Negrón Careto	*Melanitta perspicillata*	45-56 cm.
59. Gaviota de Audouin	*Larus audouini*	44-52 cm.
60. Gavión Hiperbóreo	*Larus hyperboreus*	63-68 cm.
61. Gaviota Groenlandesa	*Larus glaucoides*	52-60 cm.
62. Gavión Cabecinegro	*Larus ichthyaetus*	58-67 cm.
63. Gaviota Cáspica	*Larus cachinnans*	52-58 cm.
64. Gaviota Picofina	*Larus genei*	37-42 cm.
65. Gaviota de Bonaparte	*Larus philadelphia*	31-34 cm.
66. Gaviota Rosada	*Rhodostethia rosea*	29-32 cm.
67. Pagaza Piconegra	*Sterna nilotica*	35-42 cm.
68. Pagaza Piquirroja	*Sterna caspia*	48-55 cm.
69. Charrán Sombrío	*Sterna fuscata*	42-45 cm.
70. Fumarel Aliblanco	*Chlidonias leucopterus*	20-24 cm.
71. Mérgulo Atlántico	*Alle alle*	19-21 cm.
72. Arao aliblanco	*Cepphus grylle*	32-38 cm.

Aunque no son aves propiamente marinas, el **Martín Pescador** (*Alcedo atthis*) suele observarse en las costas, en puertos y bahías durante el invierno, mientras que el **Halcón Peregrino** (*Falco peregrinus*) habita y anida en las cantiles costeros. Entre muchas otras aves curiosas, cabe señalar, como anécdota, la visita de un **Cisne Negro** (*Cygnus atratus*) a los aguas del puerto de El Musel, donde permaneció varios días, en octubre de 2002.

© Autoridad Portuaria de Gijón. DL. AS-2958/05

Puerto de Gijón

AUTORIDAD PORTUARIA DE GIJÓN. MEDIO AMBIENTE. PROGRAMA DE EDUCACIÓN AMBIENTAL

Autoridad Portuaria de Gijón

Ed 01/2006

Coordina: **Autoridad Portuaria de Gijón**
Dirección científica: **Gonzalo Gil**
Ilustrador: **Gonzalo Gil**
Diseño: **Estudio Paco Carrés.**